

**ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β'**

**17 ΜΑΪΟΥ 2010**

**ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ**

**ΘΕΜΑ Α**

**A1.** Ο ζητούμενος αριθμητικός μέσος είναι:

$$\frac{(t_1 - \bar{x}) + (t_2 - \bar{x}) + \dots + (t_v - \bar{x})}{v} = \frac{(t_1 + t_2 + \dots + t_v) - (v\bar{x})}{v} = \frac{t_1 + t_2 + \dots + t_v}{v} - \bar{x} = \bar{x} - \bar{x} = 0.$$

**A2.** Θεωρία σελίδα 86, 87, σχολικό βιβλίο.

**A3.** Θεωρία σελ. 140, σχολικό βιβλίο.

Βέβαιο είναι το ενδεχόμενο που πραγματοποιείται πάντα και τέτοιο είναι το σύνολο  $\Omega$ .

Αδύνατο ενδεχόμενο είναι το ενδεχόμενο που δεν πραγματοποιείται ποτέ και τέτοιο είναι το κενό σύνολο  $\emptyset$ .

**A4.**

$\alpha$	$\beta$	$\gamma$	$\delta$	$\epsilon$
$\Sigma$	$\Lambda$	$\Sigma$	$\Lambda$	$\Lambda$

**ΘΕΜΑ Β**

**B1.** Για  $x \neq 1$  είναι:

$$\begin{aligned} \frac{f(x)-1}{x-1} &= \frac{2\sqrt{x^2-x+1}-1-1}{x-1} = \frac{2\sqrt{x^2-x+1}-2}{x-1} = \frac{2(\sqrt{x^2-x+1}-1)}{x-1} = \\ &= \frac{2(\sqrt{x^2-x+1}-1)(\sqrt{x^2-x+1}+1)}{(x-1)(\sqrt{x^2-x+1}+1)} = \frac{2(x^2-x+1-1)}{(x-1)(\sqrt{x^2-x+1}+1)} = \\ &= \frac{2(x^2-x)}{(x-1)(\sqrt{x^2-x+1}+1)} = \frac{2x(x-1)}{(x-1)(\sqrt{x^2-x+1}+1)} = \frac{2x}{\sqrt{x^2-x+1}+1} \end{aligned}$$

$$\text{Άρα } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x}{\sqrt{x^2-x+1}+1} = 1.$$

**B2.** Είναι

$$f'(x) = (2\sqrt{x^2-x+1}-1)' = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2-x+1}} (x^2-x+1)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-x+1}} \cdot (2x-1) = \frac{2x-1}{\sqrt{x^2-x+1}}$$

Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης  $f$  στο σημείο με τετμημένη  $x_0=0$  είναι:

$$f'(0) = \frac{2 \cdot 0 - 1}{\sqrt{0^2 - 0 + 1}} = -1.$$

**B3.** Αν  $\omega$  είναι η γωνία που σχηματίζει η παραπάνω εφαπτομένη με τον άξονα  $x'x$  τότε είναι:  $\epsilon\phi\omega = f'(0) = -1$ , και επειδή  $0 \leq \omega < \pi$ , προκύπτει  $\omega = \frac{3\pi}{4}$ .

**ΘΕΜΑ Γ**

**Γ1.** Αν το πλάτος κάθε κλάσης είναι  $c$ , τότε οι δύο πρώτες κλάσεις είναι  $[0, c)$  και  $[c, 2c)$ . Αφού το κέντρο της 2<sup>ης</sup> κλάσης δίνεται ότι είναι 6, προκύπτει  $\frac{c+2c}{2} = 6 \Leftrightarrow c = 4$ .

**Γ2.**

ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΚΙΛΑ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΑΣΗΣ $X_i$	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ $v_i$
[0, 4)	2	20
[4, 8)	6	40
[8, 12)	10	45
[12, 16)	14	30
[16, 20)	18	25
ΣΥΝΟΛΟ		160

$$\bar{x} = \frac{1}{160} \sum_{i=1}^5 v_i x_i = \frac{1}{160} (2 \cdot 20 + 6 \cdot 40 + 10 \cdot 45 + 14 \cdot 30 + 18 \cdot 25) = \frac{1600}{160} = 10.$$

$$s^2 = \frac{1}{160} \sum_{i=1}^5 v_i (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{160} [20(2-10)^2 + 40(6-10)^2 + 45(10-10)^2 + 30(14-10)^2 + 25(18-10)^2] =$$

$$= \frac{1}{160} \cdot 4000 = 25. \text{ Άρα } s=5.$$

**Γ3.** Είναι  $CV = \frac{s}{\bar{x}} = \frac{5}{10} = 50\% > 10\%$ . Άρα το δείγμα δεν είναι ομοιογενές.

**Γ4.**  $P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)} = \frac{\frac{1}{4} \cdot v_2 + v_3 + \frac{1}{2} \cdot v_4}{160} = \frac{\frac{1}{4} \cdot 40 + 45 + \frac{1}{2} \cdot 30}{160} = \frac{70}{160} = \frac{7}{16}$ .

Παρατήρηση: Για τον υπολογισμό της τυπικής απόκλισης  $s$  στο Γ2 ερώτημα θα μπορούσε εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί και ο τύπος που δίνεται ως εξής:

$$s^2 = \frac{1}{160} \sum_{i=1}^5 x_i^2 v_i - \left( \frac{\sum_{i=1}^5 x_i v_i}{160} \right)^2 = \frac{1}{160} (20000) - (\bar{x})^2 = 125 - 100 = 25. \text{ Άρα } s=5.$$

## ΘΕΜΑ Δ

Δ1.

$$f'(x) = \frac{1}{x-P(A)} - (x-P(A)) = \frac{1-(x-P(A))^2}{x-P(A)} = \frac{(1-x+P(A)) \cdot (1+x-P(A))}{x-P(A)}$$

Είναι  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x_1 = P(A) + 1$  ή  $x_2 = P(A) - 1$ .

Είναι  $x_1 > P(A)$  διότι  $P(A) + 1 > P(A) \Leftrightarrow 1 > 0$  που ισχύει,

ενώ  $x_2 < P(A)$  διότι  $P(A) - 1 < P(A) \Leftrightarrow -1 < 0$ , άρα η  $x_2$  απορρίπτεται.

Για το πρόσημο της  $f'(x)$  έχουμε:

α)  $x > P(A)$  άρα  $x - P(A) > 0$

β)  $x > P(A)$  άρα  $x - P(A) > 0$  και  $x - P(A) + 1 > 1 > 0$ .

γ) Έτσι  $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 1 - x + P(A) > 0 \Leftrightarrow x < 1 + P(A)$  και  $f'(x) < 0 \Leftrightarrow$

$1 - x + P(A) < 0 \Leftrightarrow x > 1 + P(A)$ .

Έτσι ο πίνακας μεταβολών για την  $f$  είναι:

$x$	$P(A)$	$1+P(A)$	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		↗	↘

Επομένως η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα στο  $(P(A), 1 + P(A)]$  και γνησίως φθίνουσα στο  $[1 + P(A), +\infty)$ .

Η  $f$  παρουσιάζει μέγιστο στο  $x = 1 + P(A)$  το

$$\begin{aligned} f(1+P(A)) &= \ln(1+P(A)-P(A)) - \frac{1}{2}(1+P(A)-P(A))^2 + P(B) = \\ &= \ln 1 - \frac{1}{2} \cdot 1^2 + P(B) = P(B) - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Δ2. Αφού η  $f$  παρουσιάζει ακρότατο στο σημείο  $x_0 = 5/3$ , από Δ1 θα είναι:

$$1 + P(A) = 5/3 \Leftrightarrow P(A) = \frac{5}{3} - 1 \Leftrightarrow P(A) = \frac{2}{3}.$$

Επίσης αφού  $f(x_0) = 0$  είναι λόγω του Δ1  $f(1+P(A)) = 0 \Leftrightarrow P(B) - \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow P(B) = \frac{1}{2}$ .

Δ3. Η ζητούμενη πιθανότητα είναι:  $P(A \cap B)' = 1 - P(A \cap B)$ .

Όμως  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$  άρα

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{5}{6} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Άρα } P(A \cap B)' = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

Δ4. Η ζητούμενη πιθανότητα είναι:  $P[(A-B) \cup (B-A)] = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$ .

$$\text{Άρα } P[(A-B) \cup (B-A)] = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = \frac{1}{2}.$$