

# ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β'

19 ΜΑΪΟΥ 2010

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

## ΘΕΜΑ Α

- A1. Θεωρία, θεώρημα, σελίδα 304 σχολικού βιβλίου.  
A2. Θεωρία, ορισμός, σελίδα 279 σχολικού βιβλίου.  
A3. Θεωρία, ορισμός, σελίδα 273 σχολικού βιβλίου.  
A4.

α	β	γ	δ	ε
Σ	Σ	Λ	Λ	Σ

## ΘΕΜΑ Β

B1. Είναι:  $z + \frac{2}{z} = 2 \Leftrightarrow z^2 - 2z + 2 = 0.$

Άρα  $z_1 = \frac{2-2i}{2} = 1-i, \quad z_2 = \frac{2+2i}{2} = 1+i.$

B2. Είναι:  $z_1^{2010} + z_2^{2010} = (1-i)^{2010} + (1+i)^{2010} = [(1-i)^2]^{1005} + [(1+i)^2]^{1005} =$   
 $= (1-2i-1)^{1005} + (1+2i-1)^{1005} = (-2i)^{1005} + (2i)^{1005} = (-2)^{1005} \cdot i^{1005} + 2^{1005} \cdot i^{1005} =$   
 $= (-2)^{1005} \cdot (i^2)^{502} \cdot i + 2^{1005} \cdot (i^2)^{502} \cdot i = (-2^{1005}) \cdot i + (2^{1005}) \cdot i = -2^{1005} \cdot i + 2^{1005} \cdot i = 0$

### 2η λύση:

Είναι:

$$(1-i)^{2010} + (1+i)^{2010} = (1-i)^{2010} + [i(1-i)]^{2010} =$$
$$= (1-i)^{2010} + i^{2010} \cdot (1-i)^{2010} = (1-i)^{2010} \cdot (1+i^{2010}) = (1-i)^{2010} \cdot (1-1) = 0$$

B3. Είναι

$$|w - 4 + 3i| = |z_1 - z_2| = |1 - i - 1 - i| = |-2i| = 2$$

Έστω  $w = x + \psi i$ , τότε

$$|x + \psi i - 4 + 3i| = 2 \Leftrightarrow |(x-4) + (\psi+3)i| = 2 \Leftrightarrow (x-4)^2 + (\psi+3)^2 = 4$$

Επομένως ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του  $w$  είναι ο κύκλος με κέντρο το σημείο  $K(4, -3)$  και ακτίνα  $\rho = 2$ .


**B4.** Το  $|w|$  είναι η απόσταση της εικόνας  $M(w)$  από την αρχή  $O(0, 0)$ , δηλαδή το μήκος  $(OM)$ . Από τη Γεωμετρία όμως, γνωρίζουμε ότι αν η ευθεία  $OK$  τέμνει τον κύκλο στα σημεία  $A$  και  $B$  τότε

$$(OA) \leq (OM) \leq (OB) \quad (1)$$

που σημαίνει ότι η μέγιστη τιμή του  $|w|$  είναι το μήκος  $(OB)$  και η ελάχιστη το μήκος  $(OA)$ .

Όμως

- $(OA) = (OK) - \rho = 5 - 2 = 3 \quad (2) \quad \text{και}$
- $(OB) = (OK) + \rho = 5 + 2 = 7 \quad (3)$



Επομένως, λόγω των (1), (2) και (3) έχουμε  $3 \leq |w| \leq 7$ .

**2η λύση:**

Γράφουμε:

$$|w| = |w + (-4 + 3i) - (-4 + 3i)|$$

Οπότε σύμφωνα με την τριγωνική ανισότητα έχουμε:

$$\left| |w + (-4 + 3i)| - |-4 + 3i| \right| \leq |w + (-4 + 3i) - (-4 + 3i)| \leq |w + (-4 + 3i)| + |-4 + 3i| \quad \text{ή}$$

$$\left| |z_1 - z_2| - |-4 + 3i| \right| \leq |w| \leq |z_1 - z_2| + |-4 + 3i| \quad \text{ή} \quad |2 - 5| \leq |w| \leq 2 + 5.$$

Άρα  $3 \leq |w| \leq 7$ .

## ΘΕΜΑ Γ

**Γ1.** Η  $f$  είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο  $R$ , ως αποτέλεσμα πράξεων συνεχών και παραγωγίσιμων συναρτήσεων με παράγωγο:

$$f'(x) = 2 + \frac{1}{x^2+1} (x^2+1)' = 2 + \frac{2x}{x^2+1} = \frac{2x^2+2x+2}{x^2+1} = \frac{2(x^2+x+1)}{x^2+1}.$$

Επειδή  $x^2+x+1 > 0$  καθώς και  $x^2+1 > 0$  για κάθε  $x \in R$ , είναι  $f'(x) > 0$  για κάθε  $x \in R$ . Άρα η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα στο  $R$ .

**Γ2.** Η δοσμένη εξίσωση γράφεται ισοδύναμα:

$$2(x^2 - 3x + 2) = \ln[(3x - 2)^2 + 1] - \ln(x^4 + 1) \Leftrightarrow$$

$$2x^2 - 2(3x - 2) = \ln[(3x - 2)^2 + 1] - \ln(x^4 + 1) \Leftrightarrow$$

$$2x^2 + \ln(x^4 + 1) = \ln[(3x - 2)^2 + 1] + 2(3x - 2) \Leftrightarrow$$

$$2x^2 + \ln(x^4 + 1) = 2(3x - 2) + \ln[(3x - 2)^2 + 1] \Leftrightarrow f(x^2) = f(3x - 2) \quad (1)$$

Επειδή η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα, θα είναι και 1-1.

Επομένως από την (1) προκύπτει

$$x^2 = 3x - 2 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0. \text{ Άρα } x = 1 \text{ ή } x = 2.$$

**Γ3.** Είναι  $f''(x) = \left( 2 + \frac{2x}{x^2+1} \right)' = 2 \left( \frac{x}{x^2+1} \right)' = 2 \frac{x'(x^2+1) - x(x^2+1)'}{(x^2+1)^2} =$

$$= 2 \frac{x^2+1 - 2x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}.$$

Είναι  $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$  ή  $x = 1$ , ενώ είναι  $f''(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-1, 1)$  και

$$f''(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty).$$

Έτσι η  $C_f$  έχει σημεία καμπής στα σημεία με τετμημένες  $x_1 = -1$ ,  $x_2 = 1$ .

• Η εφαπτόμενη της  $C_f$  στο  $x_1 = -1$  έχει εξίσωση ( $\varepsilon_1$ ):

$$y - f(-1) = f'(-1)(x+1) \Leftrightarrow y - (-2 + \ln 2) = 1(x+1) \Leftrightarrow y = x + \ln 2 - 1$$

$$\text{Για } x=0 \text{ προκύπτει } y = \ln 2 - 1$$

• Η εφαπτόμενη της  $C_f$  στο  $x_2 = 1$  έχει εξίσωση ( $\varepsilon_2$ ):

$$y - f(1) = f'(1)(x-1) \Leftrightarrow y - (2 + \ln 2) = 3(x-1) \Leftrightarrow y = 3x - 1 + \ln 2$$

Για  $x=0$  προκύπτει  $y = \ln 2 - 1$ .

Οι  $(\varepsilon_1)$  και  $(\varepsilon_2)$  τέμνονται στο σημείο  $M(0, \ln 2 - 1)$  του άξονα  $y'y$ .

$$\begin{aligned}
 \Gamma 4. \quad \int_{-1}^1 x f(x) dx &= \int_{-1}^1 (2x^2 + x \ln(x^2 + 1)) dx = 2 \int_{-1}^1 x^2 dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (x^2 + 1)' \ln(x^2 + 1) dx = \\
 &= 2 \int_{-1}^1 x^2 dx + \frac{1}{2} [(x^2 + 1) \ln(x^2 + 1)]_{-1}^1 - \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (x^2 + 1) [\ln(x^2 + 1)]' dx = \\
 &= 2 \int_{-1}^1 x^2 dx + \frac{1}{2} [(x^2 + 1) \ln(x^2 + 1)]_{-1}^1 - \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (x^2 + 1) \frac{2x}{(x^2 + 1)} dx = \\
 &= 2 \left[ \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 + \frac{1}{2} \cdot 0 - \frac{1}{2} [x^2]_{-1}^1 = 2 \frac{2}{3} - \frac{1}{2} (1 - 1) = \frac{4}{3}.
 \end{aligned}$$

### ΘΕΜΑ Δ

**Δ1.** Η συνάρτηση  $g(t) = \frac{t}{f(t) - t}$  είναι

α) ορισμένη σε όλο το  $\mathbb{R}$  αφού  $f(t) \neq t$  για κάθε  $t \in \mathbb{R}$  και  
 β) συνεχής σε όλο το  $\mathbb{R}$ , ως πηλίκο συνεχών.

Έτσι η συνάρτηση  $f(x) = \int_0^x g(t) dt + x + 3$  είναι παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$ , με

$$f'(x) = g(x) + 1 = \frac{x}{f(x) - x} + 1 = \frac{x + f(x) - x}{f(x) - x} = \frac{f(x)}{f(x) - x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

**Δ2.** Είναι  $g'(x) = \left[ \frac{(f(x))^2 - 2x \cdot f(x)}{(f(x) - x)^2} \right]' = 2f(x) \cdot f'(x) - 2f(x) - 2x \cdot f'(x) =$

$$= 2f'(x)(f(x) - x) - 2f(x) \stackrel{(\Delta 1)}{=} 2 \frac{f(x)}{f(x) - x} (f(x) - x) - 2f(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

**Δ3.** Είναι:  $f(0) = 0 + 3 + \int_0^0 \frac{t}{f(t) - t} dt = 3.$

Λόγω του Δ2 είναι  $(f(x))^2 - 2x \cdot f(x) = c, \quad c \in \mathbb{R}.$

Για  $x = 0$  προκύπτει  $c = (f(0))^2 - 2 \cdot 0 \cdot f(0) = 9.$

Έτσι  $(f(x))^2 - 2x \cdot f(x) = 9 \Leftrightarrow (f(x))^2 - 2x \cdot f(x) + x^2 = x^2 + 9 \Leftrightarrow$

$$(f(x) - x)^2 = x^2 + 9. \quad (1)$$

Αν θέσουμε  $h(x) = f(x) - x$ , έχουμε ότι η συνάρτηση  $h$  είναι συνεχής στο  $\mathbb{R}$  και

$h(x) \neq 0$  για κάθε  $x \in \mathfrak{R}$ , αφού  $f(x) \neq x$ ,  $x \in \mathfrak{R}$ .

Άρα η  $h$  διατηρεί σταθερό πρόσημο στο  $\mathfrak{R}$ , δηλαδή είναι  $h(x) > 0$  για κάθε  $x \in \mathfrak{R}$  ή  $h(x) < 0$  για κάθε  $x \in \mathfrak{R}$ .

Όμως  $h(0) = f(0) - 0 = 3 > 0$  άρα

$h(x) > 0$ ,  $x \in \mathfrak{R}$  και  $f(x) > x$ ,  $x \in \mathfrak{R}$ . (2).

Από την (1) προκύπτει ότι

$$|f(x) - x| = \sqrt{x^2 + 9} \stackrel{(2)}{\Leftrightarrow} f(x) - x = \sqrt{x^2 + 9} \Leftrightarrow f(x) = x + \sqrt{x^2 + 9}, x \in \mathfrak{R}.$$

**Δ4.** Έστω  $F(x) = \int_x^{x+1} f(t) dt$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

Είναι  $F(x) = \int_c^{x+1} f(t) dt - \int_c^x f(t) dt$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $c \in \mathfrak{R}$ .

και  $F'(x) = f(x+1) - f(x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . (1)

$$\text{Όμως } f'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}} = \frac{\sqrt{x^2 + 9} + x}{\sqrt{x^2 + 9}} > \frac{\sqrt{x^2 + x}}{\sqrt{x^2 + 9}} = \frac{|x| + x}{\sqrt{x^2 + 9}} \geq 0, x \in \mathbb{R}.$$

Δηλαδή  $f'(x) > 0$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ , άρα η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα στο  $\mathbb{R}$ .

Προκύπτει έτσι:  $x < x+1 \Rightarrow f(x) < f(x+1) \Rightarrow f(x+1) - f(x) > 0$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . (2)

Λόγω των (1), (2) η  $F$  είναι γνησίως αύξουσα στο  $\mathbb{R}$ .

Επομένως:  $x < x+1 \Rightarrow F(x) < F(x+1) \Leftrightarrow \int_x^{x+1} f(t) dt < \int_{x+1}^{x+2} f(t) dt$ .

### 2η λύση:

Η  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  είναι μια αρχική της  $f$  στο  $\mathbb{R}$  και η προς απόδειξη ανισότητα γράφεται

$$F(x+1) - F(x) < F(x+2) - F(x+1) \Leftrightarrow \frac{F(x+1) - F(x)}{(x+1) - x} < \frac{F(x+2) - F(x+1)}{(x+2) - (x+1)}.$$

Από Θ.Μ.Τ. για την  $F$  στα διαστήματα  $[x, x+1]$  και  $[x+1, x+2]$  προκύπτει ότι υπάρχουν αντίστοιχα  $\xi_1 \in (x, x+1)$  και  $\xi_2 \in (x+1, x+2)$  ώστε

$$\frac{F(x+1) - F(x)}{(x+1) - x} = F'(\xi_1) = f(\xi_1) \text{ και } \frac{F(x+2) - F(x+1)}{(x+2) - (x+1)} = F'(\xi_2) = f(\xi_2).$$

Έτσι αρκεί να δειχθεί  $f(\xi_1) < f(\xi_2)$  με  $\xi_1 < \xi_2$ , ή ισοδύναμα ότι η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα. Πράγματι:

$$f'(x) = (x + \sqrt{x^2 + 9})' = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}} = \frac{\sqrt{x^2 + 9} + x}{\sqrt{x^2 + 9}} > \frac{\sqrt{x^2} + x}{\sqrt{x^2 + 9}} = \frac{|x| + x}{\sqrt{x^2 + 9}} \geq 0, \text{ για κάθε}$$

$x \in \mathbb{R}$ , δηλαδή  $f'(x) > 0$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$  και η  $f$  γνησίως αύξουσα στο  $\mathbb{R}$ .

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑ  
ΠΑΤΡΑ